



FICHA TÉCNICA

BIOLIFE EXPERT FOLIAR

MICROORGANISMOS BENÉFICOS PARA TEMPERATURAS CÁLIDAS

BioLife Expert Foliar es un formulado biológico altamente concentrado, compuesto por un consorcio específico de hongos benéficos. Mediante inoculaciones con este producto se mejora la microbiología del ecosistema agrícola. Las cepas que componen el producto son capaces de colonizar la filósfera y otros nichos del huerto, bioestimulando los sistemas de resistencia al estrés abiótico. Recomendado para su uso en ambientes entre 20-35 ° C.

COMPOSICIÓN:

<i>Metarhizium anisopliae</i> (cepa AMTMG) *	1 x 10 ⁸ UFC/g
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa AMTBH1) *	1 x 10 ⁸ UFC/g
<i>Paecilomyces lilacinus</i> (cepa AMTPL2) *	1 x 10 ⁸ UFC/g

***Concentración mínima garantizada** 3 x 10⁸ UFC/g de hongos totales.

pH: 5,52

Densidad a 20°C (g/L): 999,0

Solubilidad en agua a 20° (g/L): < 0,1

Producto autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero para su uso en agricultura orgánica



Control ECOCERT SAS
Producto apto para su uso en
Agricultura Ecológica de acuerdo
con Reglamentos (UE)
n° 2018/848 y 2021/1165,
Reglamento NOP y Reglamento JAS.



Producto compatible con (UE)
n° 2018/848 y 2021/1165, Reglamento
NOP y Reglamento JAS para uso en
cultivos orgánicos como fertilizante.



RECOMENDACIONES DE USO

Este producto es apto para aplicaciones aéreas (avión, helicóptero, dron), máquinas electrostáticas y sistemas de riego presurizado. En aplicaciones de bajo volumen hacer dilución previa. Realizar aplicaciones con velocidad del viento inferior a 12 km/h. Se recomienda preferir un mayor número de aplicaciones que aplicaciones más concentradas. Para especificaciones detalladas o usos especializados, consulte la ficha técnica o al departamento técnico del proveedor.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Berries (Arándanos, Moras, Frambuesa, Frutillas, Murtilla, Goldenberry, Cranberries, Maqui, Zarzaparrilla, Grosellas)	25 g/hl 250 g/ha	Aplicaciones foliares en: Berries: brotación, floración, caída de pétalos y fruto cuajado, precosecha hasta cosecha. Vides: brotación, floración, cierre de racimos, pinta, precosecha y cosecha. Carozos: brotación, floración, caída de pétalos y chaqueta, precosecha hasta cosecha. Pomáceas: brotación, floración, caída de pétalos y fruto cuajado, precosecha hasta cosecha. Cítricos, Frutos secos, Olivo, Palto: brotación, floración, cuaja, precosecha a cosecha. Otros frutales: brotación, floración, cuaja, precosecha a cosecha. Para mojamientos inferiores a 1000 L se recomienda utilizar 25 g/hl. Para mojamientos superiores a 1000L se recomienda utilizar 250 g/ha.
Vides (Vid de Mesa, Vid Vinífera y Vid Pisquera)		
Carozos (Cerezo, Durazno, Damasco, Nectarino, Ciruelo)		
Pomáceas (Manzano, Peral, Membrillo)		
Cítricos (Limón, Naranja, Pomelo, Tangelo, Mandarina, Clementina)		
Frutos secos (Avellano europeo, Almendro, Nogal, Pistacho)		
Olivo, Palto, Kiwi		
Otros frutales (Granado, Papayo, Chirimoyo, Mango, Caqui)		
Hortalizas (Tomate, Lechuga, Endivia, Repollo, Col de Bruselas, Pimentón, Coliflor, Brócoli, Espinaca, Acelga, Apio, Pepino, Ajo, Ají, Zapallo, Zapallo italiano, Rabanitos, Sandía, Melón, Alcachofa, Espárrago, Cebolla, Cilantro, Achicoria, Zanahoria, Betarraga, Berenjena, Porotos, Lentejas, Garbanzos, Arvejas, Habas)	25 g/hl 250 g/ha	Repetir aplicaciones cada 2 a 3 semanas desde el inicio del crecimiento hasta la cosecha.
Viveros (frutales, forestales, ornamentales)	25 g/hl 250 g/ha	Aplicaciones foliares en brotación, floración, y precosecha.
Cultivos (Maíz, Raps, Maravilla, Remolacha)	25 g/hl 250 g/ha	Mojar toda la superficie del cultivo durante todo el periodo productivo de la planta
Papas		
Cereales (Avena, Trigo, Arroz, Triticale, Cebada)		
Plantas ornamentales (Clavel, Crisantemo, Gladiolo, Peonia)		



COMPATIBILIDAD

El principio activo del producto tiene una alta resistencia a la temperatura, desecación y la diversidad de estructuras de resistencia hace que el producto sea compatible con los productos agrícolas comunes como fertilizantes, insecticidas, fitohormonas, correctores, etc. Sin embargo, para el máximo rendimiento del producto se recomienda no aplicar en conjunto ni previo a desinfecciones con cobre, zinc y fungicidas sintéticos. Preferentemente, inocular el producto 5 días luego de la desinfección y no volver a aplicar fungicidas dentro de los próximos 21 días.

FITOTOXICIDAD

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, para animales, plantas o cualquier tipo de ser vivo, incluyendo microorganismos benéficos de la rizósfera, abejas y artrópodos útiles al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente con una durabilidad de 1 año desde su elaboración (ver envase). Una vez abierto, guardar en un lugar seco a temperatura ambiente por 30 días. Al ser hidratado el producto debe ser aplicado el mismo día.